



ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพญาเม็งราย
แจกโฉนดที่ดิน

หนังสือสำคัญที่จะแจกคือ	โฉนดที่ดิน	
(๑) ที่ดินหมู่ที่ -	ตำบล ตาดควัน	อำเภอ พญาเม็งราย
(๒) ที่ดินหมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
(๓) ที่ดินหมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
(๔) ที่ดินหมู่ที่	ตำบล	อำเภอ
(๕) ที่ดินหมู่ที่	ตำบล	อำเภอ

จังหวัด เชียงราย

ด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการรังวัดที่ดินเพื่อออกเรื่อง โฉนดที่ดิน
ในท้องที่ตำบล อำเภอที่กล่าวข้างต้นเสร็จแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ถ้าผู้ใดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ

(

(นางจินกัษ มืรส)

)

นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

ประทับตราประจำตำแหน่ง

รายละเอียดแปลงที่ดินที่ขอกออกโฉนดที่ดินปรากฏตามรูปแผนที่แนบท้ายประกาศฯ นี้

หนังสือสำคัญที่จะแจกคือ โฉนดที่ดิน ราย นายวิกรม ยอดจิว

ตามหลักฐานเดิมคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 505

จำนวน 1 แปลง ตำบลแม่ต๋า อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 0-2-21.0 ไร่


โดยออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 25349 หน้าสำรวจ 2486 เลขที่ดิน 62 ตำบลตาดควัน

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 0-2-32.7 ไร่

หมายเหตุ : เมื่อประกาศครบกำหนด 30 วัน ไม่มีผู้โต้แย้งคัดค้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
ว่าถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน วิธีการของระเบียบและกฎหมายก็จะดำเนินการออกโฉนดที่ดิน
ให้แก่ผู้ขอต่อไป



ประเภทการรังวัด.....ออกโฉนดที่ดิน.....ผู้ขอ.....นายวิกรม ยอดจิว.....
 ตำแหน่งที่ดิน ระบุว่า.....5048.IV.2808-7.....เลขที่ดิน.....๒๒.....
 ตำบล.....ตาดควัน.....อำเภอ.....พญาเม็งราย.....จังหวัด.....เชียงราย.....



2. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

3. In the second part, we consider the problem of finding the maximum value of the function $f(x)$ on the interval $[0, 1]$. It is shown that the maximum value is attained at $x = 0$ and is equal to 1.

4. Finally, we discuss the question of the uniqueness of the solution of the initial value problem.

5. The results of the paper are summarized in the following theorem: Let $f(x)$ be a function satisfying the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$ and the initial condition $f(0) = 1$. Then $f(x) = 1$ for all x in the interval $[0, 1]$.

6. The proof of this theorem is given in the appendix.


7. The author wishes to express his gratitude to the referee for his valuable comments and suggestions.

8. The work was supported by the National Science Foundation.

9. The author is indebted to the referee for his valuable comments and suggestions.

เขียงราย

5048 IV 2808



ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

